

PrEP (pre-exposure prophylaxis)

PrEP on tarkoitettu hiv-infektion ennaltaehkäisyyn henkilöille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta. Riski voi olla korkea, jos on esimerkiksi suojaamatonta seksiä useiden satunnaisten seksipartnereiden kanssa, suonensisäisten huumeiden käyttöä tai seksikumppani, jolla on hiv-tartunta, eikä hän ole toimivalla hiv-lääkityksellä.

PrEP perustuu emtritsitabiinin ja tenofoviiridisoproksiilin yhdistelmähoitoon. PrEPin voi aloittaa hiv-hoitoon perehtynyt lääkäri.

PrEP estää hivin tarttumisen

Tutkimusten mukaan PrEP on oikein käytettynä erittäin tehokas hivin ennaltaehkäisykeino. PrEPin tehosta on kiistaton näyttö miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa.

Miten PrEPiä käytetään

1. PrEPiä voidaan käyttää päivittäin seksikontaktien tiheydestä riippumatta tai
2. PrEPiä voidaan käyttää tarpeenmukaisesti seksikontaktin yhteydessä. Tämä koskee vain miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa.



hivpoint.fi/prep

PrEP-LÄÄKITYSTÄ VOIDAAN HARKITA:

- Yhdyntöjä ilman kondomia useiden henkilöiden kanssa tai ryhmäseksiä
- Diagnooitu seksitautitartunta viimeisen vuoden aikana
- Huumeiden käyttöä seksitilanteissa (chemsex)
- Hiv-altistuksen jälkeinen estolääkityksen (PEP) käyttöä useammin kuin kerran

Vasta-aiheet PrEPin käytölle

- Hiv-positiivisuus
- Munuaisten vajaatoiminta (GFR alle 60mL/min)
- Yliherkkyys tai muu lääkekohtainen este PrEP-lääkkeille



Aloitus ja seuranta 3 kk välein

- HIVAgAb, Krea (harvemmin, jos ei munuaisriiskejä), HBsAg (aloituksen yhteydessä), seksitautitestit (kuppa, tippuri, klamydia ja tarvittaessa hepatiitti C)
- PrEPin tarpeen arviointi
- Seksuaaliterveysneuvonta
- PrEPiin sitoutumisen varmistaminen

Helsinki: Unioninkatu 45 K
Tampere: Nalkalankatu 12 F
Oulu: Kansankatu 53

Neuvontapuhelin: 0207 465 705
(ma-to 10.00-15.30)
Chat: www.hivpoint.fi


hivpoint

CHECKPOINT

hivpoint.fi/prep